

一、是非題：(每題2分，共40分)

- ( X ) 1. 為了讓身體趕快痊癒，就診時要請醫師打針並多開藥。
- ( X ) 2. 看到同學與異性相處時，要嘲笑他們並起鬨。
- ( 0 ) 3. 嘔吐、噁心、腹瀉都是食品中毒常見的症狀。
- ( 0 ) 4. 平時應有固定看診的家庭醫師作為全家人的健康顧問，提供專業的健康諮詢與妥善的醫療服務。
- ( X ) 5. 在網路上散布色情資訊並不違法。
- ( 0 ) 6. 就醫或購買藥品前，應先了解自己的身體狀況，並向醫師或藥師清楚表達。
- ( X ) 7. 在商店購買食品時，發現食品已經過期且腐敗，應假裝沒看到並放回原位。
- ( 0 ) 8. 病患和家屬在醫療過程中，應清楚表達疾病症狀，適時提出疑問，並尊重醫事人員的說明。
- ( X ) 9. 胃藥屬於處方藥，用藥應依醫師、藥師、藥劑生指示，或依藥盒、說明書上的用法和用量使用。
- ( X ) 10. 藥品只要妥善存放在冰箱冷藏，就能保存一至兩年。
- ( X ) 11. 溫度會影響藥品的安定性，溼度和光線則不會有任何影響。
- ( 0 ) 12. 如果想要獲得正確的性知識，可以運用衛生福利部 國民健康署青少年網站，解開對性的疑惑。
- ( 0 ) 13. 食品中毒時產生嘔吐、腹瀉等症狀是身體的保護機制，可將受汙染的食物盡快從體內排出。
- ( 0 ) 14. 參考政府認證的優良標章，選

購當季盛產的蔬果，可以預防化學性食品中毒。

- ( 0 ) 15. 成藥依說明書的用法和用量服用2~3次後，若效果不顯著應儘早就醫，避免耽誤病情。
- ( 0 ) 16. 醫事人員須於醫療過程中詳細說明病情，並讓病患和家屬了解後續可能發生的狀況。
- ( X ) 17. 香港腳藥膏屬於成藥，不須經醫師、藥師或藥劑生指示，即可在一般藥局或部分商店自行購得。
- ( X ) 18. 食品安全發生問題不會對人體造成立即的危害。
- ( 0 ) 19. 部分負擔包含「門診基本部分負擔」和「門診藥品部分負擔」。
- ( X ) 20. 醫療院所發現食品中毒病患，應在48小時內通報各縣市衛生單位。

二、選擇題：(每題2分，共40分)

- ( 4 ) 1. 下列哪項病況訊息須清楚告訴醫師，才能幫助醫師正確的診療？ ①哪裡不舒服 ②不舒服的症狀有哪些 ③各項不舒服的症狀已持續多久 ④以上皆是。
- ( 2 ) 2. 下列何者是錯誤的食品安全問題預防方法？ ①注意相關報導，拒買有問題的食品 ②購買來路不明的食品 ③注意包裝上的標示是否清楚 ④不使用不新鮮食品。
- ( 4 ) 3. 身體出現「鼻塞、頭痛」等症狀時，應選擇什麼科別掛號治療？ ①婦產科 ②胃腸科 ③泌尿科 ④耳鼻喉科。
- ( 2 ) 4. 下列哪個位置不適合儲存一般藥品？ ①房間上鎖的抽屜 ②浴室的置物櫃 ③放在高架



上的藥盒 ④客廳櫃子的上層。

- (2) 5. 下列關於網路交友的敘述何者正確？ ①網路上的朋友真實可靠 ②上網交友必須慎重，並且要有自我保護的意識 ③網友要求見面要馬上答應，以免影響友誼 ④網路交友是認識異性最好的方式。
- (3) 6. 生病時應該怎麼做比較適當？ ①立刻到大醫院就醫 ②到藥局買藥吃 ③先到基層診所就醫 ④不予理會。
- (1) 7. 出現氣喘的症狀時，應該選擇什麼科別掛號治療？ ①胸腔內科 ②皮膚科 ③耳鼻喉科 ④胃腸科。
- (2) 8. 藥品不可以放置在什麼地方？ ①乾燥處 ②陽光直射處 ③陰涼處 ④小孩拿不到的地方。
- (4) 9. 服用藥物時，應搭配什麼來喝，以避免影響藥性？ ①牛奶 ②果汁 ③可樂 ④白開水。
- (3) 10. 咳嗽、發燒時，可以先前往基層診所就診，診所醫師會再根據病情判斷採用什麼制度，以有效利用醫療資源？ ①推薦制度 ②介紹制度 ③轉診制度 ④後送制度。
- (3) 11. 下列哪一項就醫觀念正確？ ①生病要趕快到大醫院就診，才不會延誤病情 ②既然每個月都按時繳交健保費，就應該趁看病時要求醫師多開一點藥才不浪費錢 ③應該珍惜醫療資源，遵守分級醫療制度 ④所有的疾病都要打針或用藥才能痊癒，所以應該要求醫師打針或開藥。

- (3) 12. 敏敏生病了，醫師開給敏敏一份處方藥，以下敘述何者正確？ ①也適用於其他同年齡的人 ②敏敏下次生病時可再次服用 ③只限敏敏本人、本次服用 ④任何人只要症狀相同，都可以服用。
- (4) 13. 有與藥品相關的疑問時，可透過下列哪項途徑尋求協助？ ①基層診所 ②社區藥局的藥師 ③衛生福利部 食品藥物管理署 ④以上皆是。
- (3) 14. 下列何者是預防食品中毒的正確方法？ ①調理食物前不洗手 ②用同一組器具處理生、熟食 ③選擇新鮮、衛生的食材 ④海鮮放置室溫中保存。
- (2) 15. 下列關於藥品儲存的注意事項何者正確？ ①居家常備藥品應每半年檢查藥品是否過期 ②遵守避光、避熱、防潮三大原則 ③不同用途的藥品可以放在同一容器中 ④可以用食物的空瓶裝藥品。
- (2) 16. 佳佳喉嚨痛，爸爸帶他到大醫院就醫，請問他們選擇到大醫院就醫而非基層診所，在就醫時可能會發生什麼情形？ ①檢查的儀器和項目較少 ②出入的病患較複雜，容易感染其他有傳染性的疾病 ③離家較近，不需支額外交通費用 ④部分負擔的費用較低。
- (3) 17. 下列關於餐飲人員服裝儀容與衛生習慣的注意事項何者錯誤？ ①穿戴工作衣帽 ②戴口罩 ③烹煮菜餚時抽菸 ④手部沒有傷口。
- (3) 18. 下列用藥方式何者正確？ ①為了方便服用，可以任意切開或壓碎藥品 ②症狀減輕了就



可以自行停藥 ③每次用藥前都要確認藥名及劑量 ④為求好得快，可以一次吃兩包藥。

- (4) 19. 小廷到診所就醫時，發現等候的病患很多，下列做法何者正確？ ①見到醫師後大發脾氣 ②衝入診間要求醫師先行診治 ③離開診所，自行到藥局購買成藥服用 ④利用等待時間思考見到醫師後如何表達自己的症狀。

- (3) 20. 下列哪項就醫費用在全民健保給付範圍內？ ①病房差額費 ②膳食費 ③一般門診診察費 ④掛號費。

三、回答問題：(每個答案1分，共8分)

1. 藥品依法可分為哪3類？

成藥 指示藥 處方藥

2. 當身體出現咳嗽、流鼻水等症狀時，應該求診於哪一個科別？

一般內科或耳鼻喉科

3. 請寫出1項食品安全問題的預防方法。

拒買標示不清或來路不明的食品

4. 請舉出2項病患和病患家屬的義務。

1. 充實正確醫療資訊  
2. 不隱瞞病情

5. 什麼是「分級醫療」？

一般非緊急狀態下先到基層診所就醫再由醫師決定是否轉診

四、勾選題：(每個答案1分，共12分)

1. 下列關於藥品分級的敘述，正確的請打勾。

( ) (1) 不管是哪一類的藥品，都可

以在藥局自行購買。

(✓) (2) 成藥的藥效通常較緩和，如果服用之後效果還不顯著，應儘早就醫，以免耽誤病情。

(✓) (3) 處方藥是經過醫師診斷病情後，對症開立處方箋，再經藥師確認後調配的藥劑。

2. 網路沉迷可能導致哪些影響？請打勾。

(✓) (1) 手腕關節發炎。

( ) (2) 家庭關係和樂。

(✓) (3) 注意力不集中。

( ) (4) 睡眠充足。

(✓) (5) 影響課業表現。

3. 下列關於全民健保的敘述正確的請打勾。

(✓) (1) 參加全民健保後，看病仍需繳交部分負擔費用。

( ) (2) 去各級醫療院所就診時，須支付的部分負擔費用都相同。

(✓) (3) 去區域醫院就診的部分負擔費用比醫學中心便宜。

(✓) (4) 急診的部分負擔，不管在每一級醫療院所，都高於同級門診的部分負擔。

4. 誰的用藥的觀念正確？請打勾。

( ) (1) 阿倫：這次的感冒和上次的感冒症狀類似，可以吃上次剩下來的藥，不用看醫師了。

(✓) (2) 小佳：用藥時要遵守醫師或藥師的指示服用。

( ) (3) 小珍：為了讓病趕快好，可以自行增加藥的分量。

(✓) (4) 丁丁：用藥之前要詳細閱讀藥品標示的內容。

5. 下列哪些病症需要送急診室處理？請勾選正確的答案。

( ) (1) 流鼻水。

(✓) (2) 休克、昏迷。

( ) (3) 失眠。

(✓) (4) 大出血、嚴重車禍及外傷。