

風險行為vs預防方法



海洛因等藥物濫用



拒絕毒品



成癮



接受替代治療

(以服用美沙酮/丁基啡因取代鴉片類藥物)



共用針具或稀釋液



使用清潔針具、
不共用針具及稀釋液



感染愛滋等血液傳染病



每3-6個月定期接受愛滋篩檢
使用PrEP



藥癮戒治資源 與服務管道



有用藥問題或需要戒癮治療？



各縣市政府設有毒品危害防制中心(諮詢專線：0800-770-885)，提供心理支持、法律諮詢、戒癮、愛滋篩檢、減害計畫等服務。



您也可以前往衛生福利部指定之藥癮戒治機構，尋求醫療院所身心科或精神科醫師協助。



哪裡可以取得清潔針具呢？



各縣市衛生局設有清潔針具執行點及衛教諮詢服務站喲！



清潔針具使用後，請記得將針具繳回，不可以棄置在一般垃圾桶唷！



認識更多藥癮與愛滋相關資訊？

心口司



藥癮衛教宣導資源

疾管署




藥癮愛滋減害Q&A



衛生福利部疾病管制署
TAIWAN CDC

藥癮減害



鴉片類

藥物種類：海洛因(4號、白粉)等鴉片類藥物。

施用方式：常見以注射方式施用。

危險性：共用針具(包含針頭、針筒、稀釋液)而大幅提升感染愛滋、B/C型肝炎等血液傳染病之風險。

預防方式：

- **不共用**針具、稀釋液、容器。
- 利用各縣市衛生局有提供之**清潔針具**、**稀釋液**等衛教諮詢服務。
- 有風險行為，每3-6個月進行**愛滋篩檢**。
- 使用暴露愛滋病毒**前**預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，積極**尋求**指定藥癮戒治機構或相關單位**協助**。

藥愛防治



非鴉片類

藥物種類：甲基安非他命(煙、安、冰等)、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等非鴉片類藥物。

施用方式：常見以吸食或注射(slam)方式施用。

危險性：發生「**藥愛**」(Chemsex)行為，又稱以**藥助性**，指性行為時合併使用成癮藥物，以增強感官或感受，而出現自制力降低、影響思考與判斷，繼而發生**未有保護措施的性行為**，大幅提升感染愛滋病毒、梅毒、淋病等性傳染病之風險。

預防方式：

- **避免使用藥物助性。**
- **性行為時全程正確使用保險套與水性潤滑液。**
- **有風險行為，每3-6個月進行愛滋篩檢。**
- **使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。**
- **有用藥問題，積極尋求指定藥癮戒治機構或相關單位協助。**

風險行為vs預防方法



安非他命等藥物濫用



拒絕毒品




以藥助性



接受諮詢及戒癮服務



發生無防護措施行為
(未用保險套)



使用保險套(搭配水性潤滑液)、PrEP



感染愛滋、梅毒等
性傳染病



每3-6個月定期接受
愛滋篩檢



愛滋防治資源 與服務管道



愛滋篩檢服務管道



疾管署與醫療院所合作，提供免費、快速、隱私且保密的**匿名篩檢服務**，只要約20分鐘即可知道檢驗結果!



您也可以購買**愛滋自我篩檢**試劑，自行檢測唷!



篩檢結果代表什麼意義呢?



愛滋匿名篩檢及自我篩檢都屬於初步檢驗，檢驗結果若呈「陽性」，不代表確診感染，請務必前往「愛滋指定醫療院所」接受進一步確認檢驗。



愛滋初步檢驗結果若呈「陰性」，代表沒有感染，但仍可能處於空窗期，還是要避免風險行為、定期篩檢唷!



什麼是暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)?

PrEP是國際研究證實可有效預防愛滋病毒的事前預防性藥物，透過持續穩定服用藥物，預防感染愛滋病毒的保護力可達9成。

注意!!使用PrEP須經醫師評估，且沒有感染愛滋病毒唷!

