

藥不藥·一念間行動博物館

計畫書



主辦單位：法務部、臺南市政府毒品危害防制中心、臺南市政府衛生局
聯絡人：林佩瑩 06-2679751 分機 181

107年6月5日

目次

一、活動前言.....	2
二、活動目的.....	2
三、指導單位.....	2
四、合作單位.....	2
五、協辦單位.....	2
六、活動期間.....	2
七、活動地點.....	2
八、主要目標觀眾.....	3
九、展示故事線.....	3
十、展示效益.....	11
附件一、行動博物館模擬圖.....	12
附件二、行動博物館展示配置.....	13
附件三、行動博物館展示文稿.....	14

一、活動前言

台灣藥物濫用的嚴峻，現在約有一半的監所受刑人是與藥物濫用犯罪有關。近年新興毒品的出現，偽裝成各樣不易辨認的毒零食、毒奶茶咖啡包等樣式，讓年輕學子甚至學童容易誤食進而成癮，年紀輕輕就染上毒品成為棘手不易防範的課題。因此本展透過影像與體驗操作展品讓參觀者認識藥物濫用的問題與危害，進而避免陷入毒害陷阱。

二、活動目的

1. 透過巡迴車的便利性，將防範藥物濫用的資訊與教育活動帶到全台。
2. 透過毒害影像展示，讓參觀者認識濫用藥物以及了解其危害與陷阱。
3. 展示實際藥物濫用社會案例、影片，讓參觀者明白濫用所影響的不只個人，連帶家庭與社會都會受到傷害。
4. 展示現今流行新興毒品樣態，讓參觀者能認識了解，進而留心加以防範避免誤入陷阱。

三、指導單位

教育部、法務部

四、合作單位

台中科博館、矯正署、法醫研究所與其它合作單位

五、協辦單位

新光三越西門店（小西門）、臺南市立新營文化中心

六、活動期間

107年10月1日起至107年10月31日

七、活動地點

溪南：10/1-10/15 新光三越西門店（小西門）

溪北：10/17-10/31 臺南市立新營文化中心廣場

八、主要目標觀眾

中小學生與一般大眾

九、展示故事線

A 區吸毒對人體與健康的影響展區

A-1 藥到命除

月光下青少年向藥頭買毒品場景轉換成骷髏頭的錯覺圖

(展示手法：錯視圖)



A-2.真藥命

介紹一念之間的濫用藥物造成的身癮與心癮的要命結果。

(展示手法：圖板、海市蜃樓鏡)



A-3.不藥臉

介紹藥物濫用所造成的外貌不良影響，來勸服參觀者不要濫用藥物來避免藥物對其外貌

的影響。

(展示手法：圖板、臉部變化節目、模擬吸毒後面貌展示)



A-4.藥損大腦

介紹藥物濫用(如安非他命、古柯鹼)造成使用者腦部的損害。


(展示手法：圖板)



A-5.藥傷人體

介紹藥物濫用對人體造成的傷害。

(展示手法：圖板與影片)



B.藥瘋了與「藥品?毒品?」展區

B-1.藥瘋了影片



展示吸食古柯鹼(Crack)、第二代浴鹽(Flakka)、LSD(迷幻藥)後的脫序行為醜態。

B-2.毒品?藥品?

(展示手法：圖板)



C.藥害影片與藥害個人、家庭、社會新聞展區

C-1.藥害影片



C-2.藥害影片側牆背景



C-3.藥害個人、家庭、社會案例新聞

介紹藥物濫用毒害個人、家庭、社會的真實案例。

(展示手法：圖板與影片)



D.鴉片與毒害在台灣展區

D-1.鴉片在台灣

(展示手法：圖板)



D-2.毒害在台灣

(展示手法：圖板)



E.新興毒品展區

E-1.藥你上當

介紹披著羊皮的藥頭狼所設下的新興毒品偽裝陷阱與新興毒品的危害。

(展示手法：模型、圖板、3D 幻視圖)



E-2.認識新興毒品

(介紹新興毒品種類、模型展示)



E-3.新興毒品新聞案例



E-4.新興毒品 3D 幻視圖



F.藥命的影響

利用動感平台的節目，介紹一念間把持不住濫用藥物的行為後果。
(展示手法：動感平台展示)



G.不藥，千萬不藥

介紹防止藥物濫用的作法。
(展示手法：圖板)



G-1. 藥命的謊言

介紹藥頭所設下引誘人使用成癮性藥物的謊言與手法。

(展示手法：圖板與電腦遊戲)



G-3. 藥命的選擇

(展示手法：圖板與藥籤筒)



H. 藥害的陰影展區

介紹學生與家人藥物成癮下的生活陰影與求助管道。

(展示手法：圖板與窺孔展品)

H-1. 你家有人吸毒嗎？

H-2. 發現家人吸毒怎麼辦？



H-3.戒毒一線生機(求助電話)
(展示手法：圖板與窺孔展品)



H-4.人生壓力面對面
(展示手法：圖板與互動面具)




十、展示效益

- 1.讓參觀者了解吸食毒品對個人身心健康有著全面性的毀壞，以及長期吸食所造成的成癮現象，使家庭、社會連帶著都要付出代價。
- 2.展示近年興起的新興毒品，讓參觀者能對花樣百變的變裝毒品多份警戒，避免誤食上癮。
- 3.展示真實吸毒者吸毒前後影像和模擬吸毒軟體讓觀眾看見自己吸毒後的樣貌，明白毒品對個人身心的危害摧殘，一旦接觸毀敗一生。
- 4.認識毒品和相關處罰條例，以及如何遠離毒害、拒絕毒害。

附件一、行動博物館模擬圖




附件二、行動博物館展示配置



藥不藥——愈問特展 (巡迴展示車配置圖)

附件三、行動博物館展示文稿

藥不藥·一念間行動博物館展示文稿 (古今法醫傳奇與反毒防罪體驗特展延伸活動)



A 區吸毒對人體與健康的影響展區

A-1 藥到命除

月光下青少年向藥頭買毒品場景轉換成骷髏頭的錯覺圖
(展示手法：錯視圖)



一念之間動念試毒所造成的毒品成癮將會很要命。

A-2.真藥命

介紹一念之間的濫用藥物造成的身癮與心癮的要命結果。
(展示手法：圖板、海市蜃樓鏡)



根據 104 年食品藥物管理署與台大公衛學院合作的研究發現，吸毒者死亡風險是同齡者的 5-6 倍，住院比率更是一般人 10 倍以上。長期吸食毒品會產生藥物成癮的症狀，依賴毒品才能獲得短暫的快樂舒適，久之毒性累積在身體裡，造成機能失調毀損產生中毒症狀：嗜睡、感覺遲鈍、運動失調、幻覺、妄想、定向障礙等。若使用靜脈注射毒品，可能帶來 B 肝、愛滋病等血液傳染疾病。在毒品戒斷時期，突然停藥或降低劑量，會產生併發症使吸毒者難以忍耐甚至自殺。在精神上，吸毒產生幻覺造成的精神障礙，往往圍繞著毒品打轉而無法正常生活甚至喪失人性。

A2-2.藥癮海市蜃樓鏡



吸毒的欣快感會在大腦形成持久記憶，甚至是終生難忘，所以才會有吸毒者「身癮易除，心癮難戒」與「吸毒一時、戒毒一世」等說法。

請動手摸看看吸毒後，深入記憶的「癮」字。

A-3.不藥臉

介紹藥物濫用所造成的外貌不良影響，來勸服參觀者不要濫用藥物來避免藥物對其外貌的影響。

(展示手法：圖板、臉部變化節目、模擬吸毒後面貌展示)



吸毒面貌的改變：

眼睛：會出血(泛紅)、易流淚、眼眶泛黑，瞳孔不正常放大或縮小。

鼻子：發紅、破皮、鼻塞、流鼻水、鼻孔殘留粉末。

嘴巴：持續性口乾舌燥。

皮膚：潰傷、紅斑疹、靜脈炎。

其他：目光呆滯、體重極速減輕、身上有異味

A3-3. 模擬吸毒後面貌展示



A-4. 藥損大腦

介紹藥物濫用(如安非他命、古柯鹼)造成使用者腦部的損害。

(展示手法：圖板)



大腦的多巴胺系統是人體天然的獎酬機制，當我們享受美食、發展興趣會刺激多巴胺分泌，產生愉悅、快樂的感覺。濫用海洛因、嗎啡、古柯鹼、安非他命等藥物在化學作用下會使腦部的多巴胺大量產生，讓人感到飄飄欲仙，許多毒癮者為了維持這種快樂感，不斷的持續使用藥物，甚至越用越多無法自拔造成上癮現象。而且根據學者研究發現，長期使用毒品會對腦部造成不可回復的嚴重傷害，例如食用搖頭丸(MDMA)會損害腦中健康的血清素細胞 20~60%，這會影響大腦的記憶與學習功能，此外在動物實驗上發現，服用搖頭丸的猴子含有血清素的神經細胞遭到損害，即使過了七年仍舊沒有辦法完全復原到未使用藥物的狀態。




從腦部正子放射斷層掃描(PET)可看出古柯鹼吸食者腦部紅色區域比未吸食毒品者少且淡，這顯示毒品會降低腦部細胞活動進而影響許多大腦的功能。

A-5.藥傷人體

介紹藥物濫用對人體造成的傷害。

(展示手法：圖板與影片)



毒品對人體的危害：

*呼吸系統：

大麻：肺部感染、咳嗽多痰、呼吸道疾病。

*泌尿系統：

K他命：膀胱功能受損、尿少、下腹疼痛、腎功能不全。

*神經系統：

鴉片類(嗎啡、海洛因等)：呼吸抑制、強烈生理及心理成癮性。

鎮靜安眠藥(苯二氮平類、Z類藥)：精神恍惚、健忘、注意力不集中。

安非他命類(安非他命、MDMA)：妄想、幻覺、精神疾病、體溫過高甚至致死。

大麻、類大麻活性物質(K2)：幻覺、記憶、學習及認知能力受損。

一氧化二氮(笑氣)：精神異常、錯亂。

K他命：專注力、學習及注意力受損、幻覺。

合成卡西酮(浴鹽)：妄想、幻覺、攻擊性、暴力行為、自殘。

古柯鹼：被害妄想、幻覺、困倦、易怒、憂鬱。

*血液循環系統：

安非他命類(安非他命、MDMA)、合成卡西酮(浴鹽)：心悸、心律不整、
血壓增高。

一氧化二氮(笑氣)：貧血。

K他命：心搏過快、血壓上升。

靜脈注射毒品：愛滋病、肝炎等血液傳染疾病。

B.藥瘋了與「藥品?毒品?」展區

B-1.藥瘋了影片



展示吸食古柯鹼(Crack)、第二代浴鹽(Flakka)、LSD(迷幻藥)後的脫序行為醜態。

B-2.毒品?藥品?




毒品與藥品是一體兩面，非醫療使用目的而濫用的成癮性管制藥物即為毒品，而由醫師診斷所開列的成癮性管制藥物則為藥品。人們使用藥物來改變身心狀態的歷史淵源流長，在南美洲的考古中發現已有嚼食古柯葉的遺跡，古希臘的女祭司據研究是吸入地下冒出來的乙烯，在精神恍惚之際承接天諭，中國東漢的華陀就有使用大麻作麻醉劑來醫治病患的記載。然而水可載舟亦可覆舟，過度的濫用成癮性藥物所損害的不只是個人的身心健康，在晚清時期本作為藥用的罌粟被製成鴉片大量濫用，導致市場失衡引起戰爭使得清朝走向亡國一途。在資訊發達的今日，藥品的形式已從天然草藥轉變成複雜的化學合成物，所精煉與合成出的藥物也比以往更為純粹，量少藥效就很強，需要管控和專業的協助，才不會過度濫用導致憾事發生。

C.藥害影片與藥害個人、家庭、社會新聞展區

C-1.藥害影片

(展示法眼黑與白-老農的鋤頭、千瘡百孔雕刻師兩段採訪影片)



老農的鋤頭 Youtube 連結網址：<https://www.youtube.com/watch?v=7ilI4-8Onys>

千瘡百孔雕刻師 Youtube 連結網址：

<https://www.youtube.com/watch?v=0vg57atNm6c>

C-2.藥害影片側牆背景



C-3.藥害個人、家庭、社會案例新聞

介紹藥物濫用毒害個人、家庭、社會的真實案例。

(展示手法：圖板與影片)



*毒害健康案例—拉 K 女 20 歲包尿布

2014 年 8 月台中深夜一名女子獨自走在路上，看到遠處巡邏車，小跑步到巡邏車對向車道，看到巡邏車迴轉女子又跑到巡邏車對向車道，似乎是在閃躲警車，如此怪異行徑引起員警注意上前盤查。才發現白姓女子包包內有一包 k 他命和 6 片尿布，原以為白女有小孩，白女神情尷尬的表示尿布是自己要用的。因為長期使用 k 他命造成膀胱萎縮、纖維化，並有漏尿、頻尿以及血尿情形，必需終身包尿布生活。一般人採集尿液只要 5 分鐘左右時間，而白女卻要花上 5 小時才能完成，因吸食毒品而嚴重毀壞健康也讓白女懊悔不已。

*毒害家庭案例—吸毒孫砍殺祖父母

高雄男子李某在 2015 年 3 月晚間與朋友在家吸毒後，被同住的阿嬤訓斥，因此憤而不滿，將阿嬤拉去撞鐵門、拿椅子猛砸，阿公聽到聲響前來勸阻，李某非但不聽勸還衝進廚房拿菜刀將倒地的阿嬤狂砍 182 刀，後轉往房內將躲在裡面的阿公 21 刀砍死在床上，隨後用棉被覆蓋阿公屍體放火焚屍，回神後發現鑄下大錯，才心慌的跟警方自首，李某從小父母離異，由阿公和阿嬤撫養長大，國中畢業後從事鋁門窗工作，染上毒品後阿嬤常勸阻，卻沒想到一時失去理智殺害兩老，被判無期徒刑，終身褫奪公權。

*毒害社會案例—吸毒犯打死無辜副教授

2007 年 7 月台大謝姓副教授在河濱公園騎腳踏車時，慘遭剛吸毒減刑出獄的楊某攻擊。當天打著赤膊身上有刺青的楊某，像瘋子一樣在路上追打路人，路過的謝姓副教授，被楊某拉下腳踏車猛烈痛毆直到昏迷不醒，送醫後不治身亡。打死人後的楊某還破壞附近公廁公物、四處遊蕩，楊某因染毒曾八度犯案被判刑入獄，這次因減刑而被提早放出。

出獄後持續吸強力膠，導致行為失控，犯下殺人罪。吸毒犯在傷害自己的同時也破壞自己的家庭，還會因毒品活動誘發犯罪行為禍延社區與社會。

D.鴉片與毒害在台灣展區

D-1.鴉片在台灣

(展示手法：圖板)



鴉片最早出現在台灣的确切時間已不可考，但可確定的是鴉片在清朝大肆蔓延之際，台灣全島也陷於鴉片的毒害中。1895年日本占領台灣後鴉片成為必須處理的問題，起初為降低反抗並不嚴禁鴉片，爾後為鞏固財政使台灣經濟獨立而採取鴉片專賣開拓財源，對吸食者採取漸禁政策，1897年發佈《台灣鴉片令》，吸食者需登記取得吸食證才能購買，當年登記人數約有5萬，在1900年登記人數高達16萬9千人占當時人口6.3%，為增加收入總督府在1904~1929年間多次特許新增登記吸食特許者，卻無禁斷鴉片的作為引起台灣人不滿。

1930年台灣民眾黨的領導者蔣渭水醫師發電報給聯合國的前身國際聯盟，明述日本違反國際條約特許台灣吸食鴉片，國際聯盟受理該案，迫使總督府轉為積極處理台灣鴉片問題，為矯正成癮者成立「更生院」，總督府任命台灣第一位醫學博士杜聰明醫生負責成癮者的戒治工作，採取「漸禁斷療法」得到良好效果，使成癮者人數大為下降，1940年杜聰明建議總督府將「漸禁」改為「禁絕」，並對所有癮者強行治療。又當時正面臨二次大戰麻醉藥用量大增，台灣鴉片原料供應中斷，在1944年停止鴉片製造，1945年6月廢除吸食鴉片特許制度，終止鴉片專賣。

D-2.毒害在台灣

(展示手法：圖板)



國民政府接收台灣後尚無嚴重毒品問題，直到 1960 年代濫用含有甲苯的強力膠，1970 年代美國藥廠引進麻醉止痛劑-速賜康被民眾濫用，立法列管後才逐漸消失，1980 年代濫用安眠鎮靜劑：紅中、青發、白板，1990 年至今以海洛因跟甲基安非他命為主，目前藥物濫用情形除傳統的海洛因跟甲基安非他命外，搖頭丸、K 他命、喵喵、合成卡西酮類新興毒品的濫用正持續增長，新興毒品的產生與樣態比起以往更為複雜多樣，常見多種藥物混用、毒品質量不純，甚至有些不肖藥頭為降低成本還摻入雜質在內，為吸引人還會把毒品變裝成常見的食品，讓不知情者誤食毒品漸而上癮。


台灣的藥物濫用除了種類的更迭，可怕的是有增無減的吸食人數與衍生的社會問題，每天打開電視、翻開報紙總有因吸毒引起的犯罪案件，在在顯示台灣毒害的嚴重，據法務部公布自 95 年至 104 年期間的「毒品情勢分析」報告中指出，民國 104 年毒品查緝量就有 4,840.2 公斤創下 10 年來新高，104 年各級毒品的製作、買賣、運輸和轉讓所查到的人數皆較 10 年前增加，而且因吸毒坐牢出獄後二年內再犯率超過 5 成。至 106 年底法務部的統計在監人數共有 56,560 人，其中因毒品坐牢的在監人就有 28,320 人占了一半！這些毒害問題持續在你我身邊發生著，需要大家一同重視，才能降低毒品的犯罪與危害。

E.新興毒品展區

E-1.藥你上當

介紹披著羊皮的藥頭狼所設下的新興毒品偽裝陷阱與新興毒品的危害。

(展示手法：模型、圖板、3D 幻視圖)



包著糖衣的毒藥-新興毒品

新興毒品是近來興起藥物濫用的統稱，並不是某種特定的藥物，經常出現在網咖、酒吧、舞廳、夜總會、或私人聚會等場所。這些新興毒品大部分是合成藥物，毒性雖還不完全明瞭，但具有迷幻作用會影響精神，常造成意外事故。新興毒品剛使用時毒性不像傳統毒品明顯，因此常讓使用者深陷毒害而不知，也更難管制。

根據法醫所 101-105 年的統計，近年新興毒品死亡案例，平均死亡年齡為 29 歲，致死場所以旅館、摩鐵最多，從檢驗中發現吸毒者常混用多種毒品，平均一名死者身上有 4.2 種毒品，驗出比例最高者為 K 他命。依聯合國毒品與犯罪辦公室的通報資料顯示，目前新興毒品已上升到 790 種，在台灣常以「毒咖啡包」、「毒奶茶包」等變裝方式出現，並標榜混搭、三合一，而這些混合的組合也幾乎都含有 K 他命的成份。

E-2.認識新興毒品

(介紹新興毒品種類、模型展示)



- 卡芬太尼

主要成分：fentanyl

外觀：外形呈粉末狀，人工合成的化學品

作用：強效型麻醉、陣痛、娛樂性藥物

副作用：毒性比海洛英強四千倍，只要二十微克劑量，便可令人死亡

- 鱷魚(Krokodil)

主要成分：二氫脫氧嗎啡(desomorphine)、危害大成本低廉，可待因和汽油或石油混合製成。

外觀：不純淨的橘黃色液体混合物

作用：鎮痛、鎮靜效果，不僅作用迅速，其效力更是嗎啡的 8 至 10 倍

副作用：皮膚腐爛、骨肉分離的症狀，輕則要截肢，重則死亡

- 「Benzo Fury」炸彈

主要成分：MAPB，結構類似安非他命

外觀：外形呈粉末狀，常混摻在咖啡包、花草茶、液體飲料中

作用：亢奮、High、對旁人和音樂有好感，停用後則會有失落、焦慮感

副作用：心悸、血壓與體溫上升、瞳孔放大，國外有青少年服用後死亡的案例，多死於心血管合併症

- 6-methoxy Methylone

主要成分：卡西酮(cathinone)

外觀：外形呈粉末狀，混摻在毒品咖啡包中

作用：毒性和活性資料俱未清楚，僅能從物質結構驗出屬於合成卡西酮類，推測應為中樞神經興奮劑

副作用：呼吸急迫、血壓上升，甚至產生幻覺，嚴重危害健康

◦ 跳跳糖、科學麵

主要成分：混合型毒品

外觀：把毒品包裝成零食餅乾，像是跳跳糖、科學麵、王子麵，跟真的相似度接近百分之百，口味都不發生變化，甚至香味都相似

作用：可能由 MDMA (搖頭丸) 及 K 他命等毒品混製而成的，產生飄飄然、興奮、幻覺等

副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒，因參雜多種毒品混製而成，增加死亡率

◦ 小熊軟糖

主要成分：MDMA

外觀：製作成糖果、軟糖狀

作用：愉悅、多話、情緒及活動力亢進

副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒

◦ 金剛

主要成分：MDMA

外觀：外形呈粉末狀，像似梅子粉，新款迷姦藥丸(外型:糖果)

作用：聞起來有甜味，可加飲料跟放入香煙施用，沒有 K 他命的臭味，比 K 他命還便宜

副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒

◦ K 他命/K 仔

主要成分：鹽酸氯胺酮(Ketamine)

外觀：外觀成白色粉末，現多以摻入香菸，以捲菸的方式吸食

作用：有飄浮及欣快感，產生幻覺以及輕微的解離感

副作用：長期使用會造成膀胱發炎、潰爛，只要少許尿量就會疼痛，有嚴重的頻尿和急尿症狀。長期使用 K 他命亦會導致腦部病變及認知功能障礙，特別是記憶力變差

◦ 喵喵/泡泡

主要成分：Mephedrone

外觀：藍色藥丸、白色粉末，現多以毒品咖啡包或巧克力、跳跳糖等糖果的形式販售

作用：欣快、興奮、一直想說話、外向

副作用：注意力變差、短期記憶力退化、幻覺、妄想、容易激動、焦慮、憂鬱

◦ 神仙水

主要成分：GHB(液態快樂丸)

外觀：無色、無嗅、無味液體；白色粉末、藥片、膠囊

作用：喜悅、酒醉、催情效果

副作用：讓人睡覺、昏迷、死亡、記憶錯亂、遭性侵

◦ 毒品咖啡包

主要成分：MDMA(搖頭丸)、FM2、神仙水的粉末結晶、K他命、安非他命、喵喵等

外觀：以粉末的方式摻雜在咖啡包或奶茶內，以咖啡包或奶茶包的形式販售

作用：飄飄然、興奮、幻覺

副作用：幻覺、心室心律不整、急性或慢性妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害

◦ 浴鹽

主要成分：MDPV

外觀：外形多以結晶狀呈現，與市售浴鹽類似

作用：歡快、興奮

副作用：混亂、焦慮、頭痛、產生生動逼真的幻覺、強烈攻擊行為

◦ 搖頭丸

主要成分：MDMA

外觀：口服，常以各種不同顏色、圖案之錠劑、膠囊或粉末出現，現多以摻入糖果、巧克力或咖啡包中

作用：愉悅、多話、情緒及活動力亢進

副作用：食慾不振、心跳加快、體溫過高、急性高血壓、急性脫水或水中毒

◦ 毒郵票

主要成分：25B-NBOMe

外觀：將郵票浸泡在毒品溶劑中，晾乾後可放入口中吞食

作用：興奮、幻覺

副作用：似發瘋症狀；對聲音、形狀、顏色產生變形錯覺

◦ 烏羽玉

主要成分：三甲氧苯乙胺 (mescaline)

外觀：外形很像一般小仙人掌，多肉且針刺較一般仙人掌少，可攪拌成果汁飲用或直接食用

作用：興奮、幻覺

副作用：感官失調、精神分裂

• 阿拉伯茶/巧茶(Qat) (恰特草)

主要成分：卡西酮(cathinone)

外觀：外形似普通莧菜，可直接嚼食，曬乾後似茶葉，可磨成粉末，配合飲料沖服

作用：思維清晰、精力充沛、沛提振精神，覺得世間上沒有辦不到的事情

副作用：沮喪、邏輯混亂、什麼也不想做、厭食，導致營養不良、降低人體免疫力、心血管疾病

• Happy 粉

主要成分：PMMA、氟安酮

外觀：外形呈粉末狀，有如不同味道的砂糖，以加入清水、酒或汽水飲用

作用：興奮、全身發熱、增強性慾

副作用：急性肝腎衰竭、休克、猝死

E-3.新興毒品新聞案例



糖衣毒品再進化! 巧克力、枇杷膏包裝誘少年

2017 年暑假才開始兩周，彰化縣警局少年隊已查獲 35 件青少年涉毒案，其中一半是同儕間無償、免費提供毒品施用，更可怕的是這些新興毒品以咖啡包、糖果、巧克力、速食麵、冰糖包、枇杷膏等包裝來魚目混珠，容易讓人失去警戒而受害，當中以 K 他命與成分不明毒品咖啡包最多。若有人請吃東西，最好先檢查包裝是否被拆過或是再重新加熱封裝或膠帶黏貼等情形，並注意有無缺損、歪斜、上下左右不對稱、滲漏或殘留粉末等現象。不要接受陌生人提供免費試用的香菸、飲料、即溶包，不慎食用後若身體不適、頭暈，盡快離開現場或報警求助。(新聞取自：自由時報)



偽裝成巧克力、速食麵包裝等形式的毒品

毒品千奇百怪! 同學請吃軟糖竟染毒

屏東地方法院法官表示，有高中職學生被同學所騙，以你心情不好為由請吃軟糖，實際上卻是變裝後的毒品，該名學生因此染上毒癮，到無法自拔的程度，因上下學反常，才被家長發現報警處理。法官並發現目前青少年使用最多的為安非他命與 K 他命等毒品，現在毒梟還將這些二、三級毒品混合一起，做成軟糖、梅錠、果凍、咖啡包等包裝，來降低青少年的警戒心，讓他們在不知道的情況下食用，毒害青少年健康的情況越來越嚴重，同學與家長千萬要小心這些毒品偽裝的陷阱。(新聞取自：聯合新聞)



偽裝成梅片、軟糖等形式的毒品

E-4.新興毒品 3D 幻視圖



F.藥命的影響

利用動感平台的節目，介紹一念間把持不住濫用藥物的行為後果。

(展示手法：動感平台展示)



吸食迷幻藥開車車禍模擬動感平台展示

G.不藥，千萬不藥

介紹防止藥物濫用的作法。

(展示手法：圖板)



G-1.藥命的謊言

介紹藥頭所設下引誘人使用成癮性藥物的謊言與手法。

(展示手法：圖板與電腦遊戲)



藥頭為了讓更多人吸食毒品，會以朋友的身分接近你，他們會編織很多謊言來引誘你吃下他們提供的毒品，甚至是變裝後的毒咖啡、毒糖果等，幾次上癮後就要不斷拿錢跟他們買毒，藥頭只要有錢賺就好，不會在乎毒品是不是會毀了你的人生。

以下是藥頭誘惑人吸食毒品的謊言與手法：

- 「毒品可以治病」
- 「毒品可以解悶」
- 「吸毒一兩次不會上癮」
- 「摻入毒品的香菸飲料送你」
- 「毒品可以減肥」
- 「毒品免費試用」

G-2.不藥·千萬不藥

G-2-1.小心藥頭的出沒



藥頭出沒場所如：KTV、網咖、撞球場、PUB、舞廳、電影院...等，小心在這些場所受引誘而吸毒。

G-2-2.毒品相關罰則



罰則表格：

違反「毒品危害防制條例」相關罰則一覽表				
分級	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
常見濫用藥物	海洛因 嗎啡 鴉片 可卡因	亞非他命 (5S) 縮腦丸、芬蘭丸 大麻 (6S) 縮腦丸、一吻沙 西法西普 (7S) Cocaine	PM2 小粉粉 丁基海恩因 (Ketanase) 縮腦命 Amphetamine (一吻 網、K2) 可定)	Alprazolam (鎮靜片) Diazepam (安眠、鎮 寧) Lorazepam Triazolam (鎮靜藥劑)
行為	第一級毒品	第二級毒品	第三級毒品	第四級毒品
製造、運輸、販賣	死刑或無期徒刑 (十年褫奪)	無期徒刑或七年以上 (十年褫奪)	七年以上有期徒刑(七 年褫奪)	三年以上十年以下 有期徒刑(三年褫奪)
集團販賣 而持有	無期徒刑或十年 以上有期徒刑 (七百萬元)	三年以上有期徒刑(五 百萬元)	三年以上十年以下有 期徒刑(三百萬元)	一年以上七年以下有 期徒刑(一百萬元)
以強暴、脅 迫、欺騙或 其他非法 之方法使 人施用	死刑、無期徒刑 或十年以上有期 徒刑(一千萬元)	無期徒刑或七年以上 有期徒刑(七百萬元)	三年以上有期徒刑(五 百萬元)	三年以上十年以下有 期徒刑(三百萬元)
引誘他人 施用	三年以上十年以 下有期徒刑(三 百萬元)	一年以上七年以下有 期徒刑(一百萬元)	五年以上十年以下有 期徒刑(五十萬元)	三年以下有期徒刑 (三十萬元)
轉讓	一年以上七年以 下有期徒刑 (一百萬元)	六個月以上五年以下有 期徒刑(七十萬元)	三年以下有期徒刑(三 十萬元)	一年以下有期徒刑 (十萬元)
施用	六個月以上五年以 下有期徒刑	三年以下有期徒刑	罰鍰(12萬元, 並限期 接受478小時講習)	罰鍰(18萬元, 並期 接受478小時講習)
持有	三年以下有期徒刑, 或 拘役或五百元 以下罰金 純質淨重10g以 上者, 一年以上 七年以下有期徒 刑(一百萬元)	二年以下有期徒刑, 或 拘役或三百元以下罰金 純質淨重20g以上 者, 六個月以上五年以下 有期徒刑(七十萬元)	純質淨重20g以上 者, 三年以下有期徒刑 (30萬元) 罰鍰(12萬元, 並限期 接受478小時講習)	純質淨重20g以上 者, 一年以下有期徒刑 (10萬元) 罰鍰(18萬元, 並期 接受478小時講習)

*依據最新毒品危害防制條例 105.06.22 版整理

G-2-3.藥死毒九子畫像



骷髏頭亂數點錯覺圖

藥死毒丸子畫像

技法：亂視點錯覺圖

說明：藥死毒丸子中學時在 KTV 受藥頭引誘而好奇碰毒，之後為滿足毒癮而去偷竊與搶劫因此入監數年，畫像是最後她被發現的樣貌。

如何看藥死毒丸子畫像？

以下兩種觀圖方式，看出畫像中藥死毒丸子最後的樣貌。

A. 平行法：視線聚焦在圖後方的看圖方式。

B. 交叉法：視線聚焦在圖前方的看圖方式。

G-2-4. 如何說不藥



以反毒防身五術，拒絕毒品引誘：

直接拒絕-勇敢向毒品說不

遠離現場-立刻離開是非場所

轉移話題-巧妙轉移注意力

自我解嘲-幽默調侃自己拒絕
友誼勸服-表達關愛給予建議

G-3 藥命的選擇



一念之差因好奇、朋友影響、紓壓與娛樂助興而選擇吸食毒品，將會帶來終生悔恨。因為初次吸毒的欣快感會在大腦形成長久記憶，試毒者往往會因為要追求這吸毒欣快感而染上毒癮，而且一旦中斷吸毒後就會產生不舒服的戒斷症狀。此外，毒品還具有耐受性，劑量要越用越多才能達到原有的欣快感效果。吸毒者的人生最後只剩下追求下一頓的毒品，健康毀壞、家庭破碎、為毒犯罪這樣的吸毒人生是你要的吗？為了你的健康、家庭與人生，切勿嘗試吸食毒品。



濫用藥物的藥命籤

藥命籤：

- 1.生命 404-吸毒過量導致死亡。
- 2.健康 404-吸毒導致大腦與身體受損。
- 3.人生 404-吸毒成癮自毀前程。
- 4.家庭 404-吸毒耗盡家產妻離子散。

H.藥害的陰影展區

介紹學生與家人藥物成癮下的生活陰影與求助管道。

(展示手法：圖板與窺孔展品)


H-1. 你家有人吸毒嗎？



當家人出現一些異常的行為，需要多關心留意家人的生活狀況。若有吸食毒品從身體外觀、情緒表達、與人互動和房間處等漸漸會出現一些徵兆：

- * 外觀上：手部顫抖、頻尿、步履不穩，身上有異味、手臂有針孔痕跡
- * 情緒上：呈現多話、易怒、焦躁、精神亢奮或精神恍惚、幻覺。
- * 行為上：注意力不集中、反應變差、常要錢、說謊、偷竊、作息顛倒、結交怪異的朋友遠離熟識的朋友、常無理由外出不歸。
- * 房間處：有異味(如抽 K 菸會有塑膠味、安非他命有焦味)、有注射針筒與針頭、有燒過的玻璃球與鋁箔紙等

H-2. 發現家人吸毒怎麼辦？



察覺或發現家人吸毒時千萬不要慌張或馬上生氣指責，先平復情緒再去關心了解為什麼吸毒？怎麼接觸到毒品？是不是已經成癮？...溝通上避免用情緒性字眼，這會讓家人更不願意表達真正想法。給予吸毒家人正向良好環境，與不良朋友隔絕。

尋求專業協助，可至衛福部指定的藥癮戒治機構尋求資源，各縣市都有毒品危害防制中心可撥打 0800-770885 諮詢，這不會留下案底。在學校可請求師長協助，校方會提供相關資源。不要覺得這是家醜不要傳出去，或擔心會留下案底，一再拖延只會讓結果更加嚴重，毒癮所產生的反應需要專業醫生的治療才有辦法戒除。家人的溫暖支持更是吸毒者決心戒治的關鍵。

H-3.戒毒一線生機(求助電話)

(展示手法：圖板與窺孔展品)


24 小時免付費戒毒成功專線：

0800-770-885(請請你-幫幫我)



H-4.人生壓力面對面





以「不思八九，常想一二」態度來化解壓力

人生不如意十之八九，課業、升學、就業、工作、生活不如意時，負面思考造成的壓力也隨之而來。吸毒僅能讓你短暫逃避面對問題；不但無法解決這些問題，吸毒成癮還會造成另外的問題。境由心生，問題本身不是壓力的本質問題，如何對待它才是會不會產生壓力的本質問題。以感恩的心來珍惜人生如意的十之一二，用正面思考才能化解壓力問題。

