

## 腸病毒防治查核建議重點

| 機構別  | 重點事項   |
|--|--|
| 國小、幼兒園<br>(適用於兒童<br>課後照顧服務<br>中心)  | 1.洗手環境與行為  |
|  | (1)是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙  |
|  | (2)是否衛教學幼童瞭解正確洗手步驟   |
|  | (3)學幼童洗手動作是否正確   |
|  | (4)學幼童是否認知正確洗手時機   |
|  | 2.衛教宣導   |
|  | (1)學幼童是否瞭解有呼吸道症狀時要戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時要立即更換   |
|  | (2)學幼童是否瞭解打噴嚏時，應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替  |
|  | (3)是否衛教學童「生病不上學」之防疫觀念  |
|  | 3.環境清消   |
|  | (1)是否能正確配製500ppm漂白水 <sup>#</sup>   |
|  | (2)是否定期環境清潔及重點消毒   |
|  | (3)是否製作清消紀錄  |
|  | 4.防疫機制   |
|  | (1)是否建立學幼童健康監視紀錄   |
|  | (2)是否確實瞭解縣市之腸病毒疫情與停課通報機制並依循運作  |
| (3)是否知道如何查詢宣導資料  |  |
| (4)是否張貼宣導資料  |  |
| (5)是否實施家長衛教  |  |
| 嬰幼兒及學幼<br>童常出入之公<br>共場所(如遊<br>樂場、百貨賣<br>場、餐廳、親<br>子飯店等)  | 1.洗手環境   |
|  | (1)是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、擦手紙   |
|  | (2)是否張貼正確洗手步驟宣導資料  |
|  | 2.環境清消   |
|  | (1)是否能正確選用消毒劑 <sup>#</sup> ，請宣導正確配製500ppm漂白水方法                                     |
| (2)是否針對遊戲區、電梯、手扶梯、手推車、洗手間實施定期(時)消毒   |  |
| (3)是否製作消毒紀錄  |  |
| 居家<br>(含居家托育<br>人員)  | 嬰幼兒照顧者對下列事項之認知：  |
|  | 1.是否知道正確洗手步驟及時機  |
|  | 2.是否知道「生病不上學」之防疫觀念   |
|  | 3.是否知道漂白水為最簡單有效之消毒方法，並宣導正確配製500ppm漂白水方法  |
|  | 4.是否知道重症前兆病徵：「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快(無發燒時)」等 |
|  | 5.是否知道出現重症前兆病徵時，應立即送大醫院，可掌握治療黃金時間  |
| 6.是否知道新生兒腸病毒感染之初期症狀，以及須立即就醫  |  |
| 醫療機構   | 請參閱「醫療機構因應腸病毒疫情防疫作為現況查檢表」 <sup>*</sup>   |
| 產後護理機構   | 請參閱「托嬰中心及產後護理之家感染管制查核表」 <sup>*</sup>   |
| 托嬰中心   | 請參閱「托嬰中心及產後護理之家感染管制查核表」 <sup>*</sup>   |
| <sup>#</sup> ：使用500ppm漂白水(市售含氯漂白水以清水稀釋100倍)或其他具檢驗報告可證實對腸病毒有效之消毒藥品。可同時衛教防治 COVID-19需使用1,000ppm漂白水(市售含氯漂白水以清水稀釋50倍)。 |  |
| <sup>*</sup> ：請至疾管署全球資訊網首頁>傳染病與防疫專題>傳染病介紹>第三類法定傳染病>腸病毒感染併發重症>重要指引及教材項下下載。  |  |