

臺南市龍崎區龍崎國小暨龍船分校、附設幼兒園

嚴重特殊傳染性肺炎校園防疫措施

公告日期：109 年 1 月 31 日

為防堵武漢肺炎疫情在校園蔓延，學校已成立防疫小組，並於 109 年 1 月 30 日由校長擔任防疫小組召集人，請各處室主任、組長、護理師、幼兒園主任、人事主任召開因應防疫會議。會議結果如下：

一、開學前(請班級導師配合下列事項)

- (一) 請導師主動與家長連繫關心學生身體健康，並說明於開學當天請先在家測量體溫並記錄在白紙上帶至學校，當天體溫若超過 37.5 度(耳溫、額溫)並有類流感症狀時，請勿到校上課，並告知導師，防疫期間請大家配合遵守。
- (二) 請導師通知班級家長，應自備醫療口罩，自開學當天起學生應自己配戴醫療口罩到校，避免疫情傳播。
- (三) 請導師詢問、調查班級學生及家長有無由中港澳入境、湖北省(武漢)旅遊史，若有上述情事請填寫記錄單(如附件 1)並回報學校護理師，同時配合以下防疫措施(教職員工亦同)。
 - ※ 衛生單位匡列為確診病例接觸者之學生及教職員工，則需進行居家隔離 14 天，留在家中(或住宿地點)不可外出上班、上學(課)及出國。
 - ※ 由港澳入境的學生及教職員工，無論有無湖北省(含武漢)旅遊史，均需進行居家檢疫 14 天，留在家中(或住宿地點)不可外出上班、上學(課)及出國。如有發燒或呼吸道症狀，均請主動與縣市衛生局聯繫或撥打 1922。

二、開學後

- (一) 教職員工生(含鐘點老師)應配合早晚各量一次體溫(每天上學前在家測量一次體溫並記錄，放學後回家再測量一次體溫並記錄)，如出現發燒(37.5 度)類流感症狀，應主動通報學校，並戴口罩就醫，勿到校上課。【體溫紀錄表開學後統一發放】
- (二) 教職員工生應自備口罩並自開學日起配戴，防止疫情傳播。
- (三) 戶外教育及各項活動視疫情狀況調整辦理。
- (四) 防疫期間所有訪客、家長須入校園者請自備口罩戴著並在校門口配合測量體溫，無發燒再進入，避免疫情傳播。
- (五) 主動關心學生健康狀況：學校班導師或授課教師應注意學生是否有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀。
- (六) 強化衛生教育宣導：加強勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持個人衛生習慣如：打噴嚏、咳嗽需掩住口、鼻，擤鼻涕後要洗手及妥善處理口鼻分泌物等，及儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所等衛生教育宣導，並落實執行。
- (七) 常態性環境清潔消毒：班級教室及專科教室、辦公室等應每週定期針對學生經常接觸之物品表面(如門把、桌面、電燈開關或其他公共區域)進行清潔消毒，可用 1：100(500ppm)漂白水稀釋液進行擦拭。

- (八) **區隔生病之學生及教職員工**：學生或教職員工如在校期間出現發燒及呼吸道症狀，須戴上口罩，並應予安置於單獨空間(警衛室)，直到離校。
- (九) **維持教室內通風**：打開教室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用抽氣扇，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調。
- (十) **加強通報作業**：如發現疑似感染新型冠狀病毒的學生，可通報當地衛生局或撥打 1922 協助轉診，另如有其他突發群聚疫情，學校應依規定通知當地教育主管機關及會同當地衛生機關處理，並應至「教育部校園安全通報網」進行校安通報。

三、學校出現確診個案

- (一) 學校如出現嚴重特殊傳染性肺炎確診病例，則與確診病例一起上課之同學老師，安親班及社團或其他活動之同學老師均應列為確診病例接觸者，並由衛生單位開立通知書，隔離至與確診病例最近接觸日後 14 天。
- (二) 當學校出現確診病例時，應暫停各項大型活動，如班際活動、社團活動、運動會等並取消以跑班方式授課。

防疫視同作戰，請大家提高警覺，配合政府的防疫措施，一起努力對抗病毒，讓你我都能恢復平靜的生活，謝謝大家。

附件 1:

中港澳入境學生及教職員工管理記錄表

學校/機構名稱：

填報日期：

序號	姓名	類別 1. 學生 2. 教師 3. 職員工	性別	聯絡電話	入境時間	管理措施		備註
						開始時間	結束時間	

※序號說明：學生在補習班/兒童課後照護中心者，請於備註欄內註明就讀學校名稱。

學校/機構主管：

填報人員/職稱：

聯絡電話：

嚴重特殊傳染性肺炎校園防疫衛教

醫師帶你
一張圖搞懂

武漢肺炎防疫重點 總整理

為世界祈禱，疫情早日控制

肺炎症狀



死亡率15%、呼吸衰竭29%、病毒血症15%、急性心損傷12%、次發感染10%

Huang C, Wang Y, Li X, et al. Lancet 2020; published online Jan 24

自我預防



疾管署通報專線：1922

洗手消毒



- (1)肥皂洗手至少20秒，無法立即洗手，可用含酒精消毒液乾洗手
- (2)冠狀病毒附著在日常生活物品上，停留3至6小時會失去活性
- (3)未洗手消毒的手，切勿碰觸眼睛、鼻子、嘴巴，避免接觸傳染
- (4)除75%酒精可做消毒液外，衣物被染污，可用稀釋漂白水消毒以稀釋100倍(濃度500 ppm)漂白水浸泡衣物30分鐘(10公升水加100 c.c.漂白水混合)

洗手消毒和戴口罩同等重要，千萬不可輕忽

戴口罩注意



開：檢查口罩

有顏色為外層，鼻樑條應在外層上方

戴：戴上口罩

鬆緊帶掛雙耳，口罩完全攤開至下巴

壓：輕壓鼻樑

鼻樑條固定鼻樑上方，輕壓使其貼合

密：確認緊密

確認口罩正確配戴，緊密貼合無縫隙

脫口罩注意

脫口罩請抓口罩耳掛

別接觸口罩外層表面

丟棄口罩後務必洗手

用完即丟不重複使用

妥善處理丟棄的口罩

《參考資料》衛生福利部疾病管制署、美國疾病管制與預防中心

醫師 給摯愛家人的
Dr.爸 健康醫療隨筆



醫師爸

