

## 漂白水消毒注意事項

1. **班級**環境消毒可用 1：100（500ppm）漂白水稀釋液進行擦拭.教育局分發為次氯酸鈉濃度 10%：10CC 漂白水加入 2 公升清水. <市售為 5%>
2. **浴室**或馬桶表面則應使用稀釋漂白水（1000 ppm）消毒:20CC 漂白水加入 2 公升清水.
3. 消毒應該每天一次，並使用**當天泡製的漂白水**。室內空氣則需靠良好的通風以維持空氣清潔。詳細建議請參考
4. 「擦」：以擦拭方式擦地板、洗手台、水龍頭、馬桶、門把、桌椅等學童常接觸區域。
5. 「停」：擦拭後，靜置五至十分鐘，等待漂白水確實發揮殺菌功效。
6. 「沖」：用清水沖洗或擦拭方才清潔殺菌的區域。
7. 「棄」：可採用以下二種方法：
  - A.將用過的漂白水再用大量的水稀釋一遍（不要少於一百倍）才倒入廚房污水道 或戶外水溝，比較不會汙染水源。
  - B.使用完後的漂白水，**最好不要直接倒入馬桶**，如此會使**化糞池失去污水處理功能**，**致污水排出後汙染水源**。

**\*\*領取漂白水後..導師可自行在標籤紙上再貼上透明寬膠帶.預防字體因潮濕變模糊不清**

叮嚀再叮嚀....注意手部衛生

(一) 使用肥皂勤洗手為防疫最首要方法，落實「濕、搓(至少 20 秒)、沖、捧、擦」洗手 5 步驟，以及洗手 5 時機：「吃東西前、抱小孩前、回家後、如廁後以及遊戲後」，養成良好個人衛生習慣，能有效降低感染疾病之發生率。

(二) 若臨時無法或不方便濕洗手，或處於水源不充足的地方，又可能接觸到髒汗，可使用酒精 2~5c.c.乾洗手，可將細菌與部分病毒去活性化，也可達到防疫作用。

二、加強宣導咳嗽禮節

(一)**咳嗽打噴嚏時用手肘或衛生紙遮住口鼻<不要用手遮住>**並將紙丟進垃圾桶。

(二)有呼吸道不適症狀應戴口罩。

(三)用肥皂勤洗手，保持手部清潔，避免接觸眼、口、鼻。

(四)手部接觸到呼吸道分泌物之後要執行洗手

(五)與他人保持適當距離(1 公尺)。

(六)拱手不握手。