




K他命與常見新興毒品一覽表



臺南市政府毒品危害防制中心製

104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|--|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|--|---|
| 1 | 二氫去氧嗎啡 (Desomorphine) | 鱷魚 (Krokodil) | 第一級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 擁有快速且強效的類鴉片藥物的鎮靜、止痛效果 | 壞疽、靜脈炎、血栓、肺炎、腦膜炎、敗血症、骨髓炎、肝腎損傷、腦損傷及愛滋病感染等 |  |
| 2 | 苯環利定 (Phencyclidine ; PCP) | 天使塵 (Angel Dust) Love boat | 第二級毒品 | 中樞神經迷幻劑 | 麻醉用 | 會引起幻覺、躁動、胡言亂語、喪失方向感、暴力傾向、思覺失調等 |  |
| 3 | 3,4-亞甲基雙氧焦二異丁基 (3,4-Methylenedioxypropavalerone ; MDPV) | 浴鹽 | 第二級毒品 | 新興影響精神物質 中樞神經興奮劑 | 強烈興奮感、性慾增強、飢餓感減弱、睡眠減少；僅攝入少量就易成癮 | 恐慌、妄想、焦慮、躁動、失眠、營養不良、脫水、發汗、腹痛、流鼻血和全身疼痛等 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表



臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|---|-----------------------------------|-------|---------|----------------|---|--|
| 4 | 液態搖頭丸 (Gamma-Hydroxybutyrate ; GHB) | 神仙水 G水 | 第二級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 具鎮靜及麻醉效果 | 昏睡、暈眩、噁心、暫時記憶性喪失、視幻覺、心搏減慢、痙攣、呼吸抑制、昏迷等 |  |
| 5 | 亞甲基雙氧甲基安非他命 (3,4-Methylenedioxyamphetamine ; MDMA) | 搖頭丸 狂喜 忘我 綠蝴蝶 Ecstasy | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 欣快感、多話、提升感官敏感度 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、幻覺、自殺意念；過量時產生體溫過高度、脫水、低血鈉、急性高血壓、橫紋肌溶解症及急性腎衰竭等症狀 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製




104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|-----------------------|--|-------|---------|----------------------|--|--|
| 6 | 硝甲西洋 (Nimetazepam) | 一粒眠 五仔 紅豆 Give Me Five | 第三級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 治療焦慮、失眠、酒精戒斷、肌肉緊縮等症狀 | 噁心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制；對使用超過四周之長期使用者造成記憶力、注意力障礙 |  |
| 7 | 愷他命 (Ketamine) | 卡門 K他命 K仔 Special K Cat Valium | 第三級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用 | 專注力及記憶力受損、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣攣性發作；罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱壁纖維化增厚，容量變小，甚至需進行膀胱重建手術 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製




104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|---|-----------------|-------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 8 | 4-甲基甲基卡西酮 (Mephedrone) | 喵喵 Meow Meow | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 類似安非他命和搖頭丸的作用，引發中樞神經、心血管或是腸胃道、泌尿系統異常 | 嚴重幻覺、腦部受損、自殘傾向 |  |
| 9 | 氯苯基環戊酮 (Chlorophenyl cyclopentyl ketone) | 香香 | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 欣快感、時空認知扭曲的心理作用 | 濫用可能產生心搏過速、高血壓、高熱、幻覺、妄想，嚴重甚至死亡 |  |
| 10 | 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 (Methylone) | bk-MDMA | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 作用與MDMA或甲基安非他命類似，無醫療用途；欣快感、多話、提升感官敏感度 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、精神病、幻覺、自殺意念 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表



臺南市政府毒品危害防制中心製

104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|---|------------------|-------|---------------------------------|---------------------|--|---|
| 11 | 甲基胺丙基苯并呋喃 (2-Methylaminopropyl-1-Benzofuran ; MAPB) | 炸彈 Benzo Fury | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 亢奮 | 高血壓、心跳加快、身體抽搐、痙攣伴隨劇烈心跳、失去意識，嚴重導致死亡 |  |
| 12 | 卡痛 Kratom | Biak Ketum | 第三級毒品 | 植物性成癮物質，少量會產生中樞神經性興奮；用量高會造成鎮靜效果 | 鎮定劑、止痛藥 | 噁心、發癢、冒汗、口乾舌燥、便秘、頻尿和食欲不振；長期使用會導致體重降低、厭食、失眠、妄想、錯覺和嚴重的混亂 |  |
| 13 | 5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺 (5-MeO-DIPT, 5-Methoxy-diisopropyltryptamine) | 火狐狸 | 第四級毒品 | 中樞神經迷幻劑 | 興奮感、強烈幻覺、對空間時間的感覺改變 | 瞳孔放大、噁心、嘔吐、視覺及聽覺扭曲、腹瀉，過量使用具致命危險 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表



臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|------------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------------------------|---|--|
| 14 | 類大麻活性物質 | K2 Spicy | 第二級毒品、第三級毒品 | 中樞神經迷幻劑 | 興奮感、強烈幻覺，改變對空間時間的感覺，迷幻效果比大麻更強 | 焦慮、噁心、幻覺、妄想、心跳過速、短期失憶、記憶受損、無方向感、狂躁、腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷，甚至傷害呼吸系統 |  |
| 15 | 一氧化二氮，學名為氧化亞氮 (Nitrous oxide; N2O) | 笑氣 吹汽球 | 未列級數；列入關注化學物質 | 中樞神經抑制劑 | 全身性麻醉作用 | 頭重腳輕、漂浮感、欣快感、身體麻木感；長時間使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、立體感完全喪失等症狀，亦會產生抑鬱、精神錯亂 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表




臺南市政府毒品危害防制中心製

104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|---|--|---|--|
| 16 | 麥司卡林 (Mescaline；仙人 掌毒鹼) | 烏羽玉(無 刺的仙人 掌) | 第二級毒品 | 新鮮烏羽玉內 含有約0.4%的 麥司卡林，而 乾烏羽玉則有 3-6% | 麥司卡林服用後會 心搏加快、體溫和 血壓升高、皮膚發 癢和乾燥 | 幻覺、精神混亂、 產生暴力行為 |  |
| 17 | 恰特草 Khat | 阿拉伯茶 巧茶 東非罌粟 | 第二級毒品 | 含有第二級毒 品卡西酮 (Cathinone)與 第四級毒品去 甲麻黃鹼 (Cathine) | 興奮、對中樞神經 具有刺激作用 | 引起擬交感神經興 奮、造成瞳孔放 大、心搏加快和血 壓增加、易患潰瘍 ，食慾不振、長期 使用會導致永久牙 齒變黑(呈綠色) |  |




K他命與常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|---------------|----|----------------------|--|--------------------|--|---|
| 18 | 夫拉卡 Flakka | 礫石 | 未列級數 | 合成仿興奮劑 卡西酮 (Cathinone)的 化學物質，是 從阿拉伯茶提 煉而成 | 興奮、不能入睡 | 失眠、營養不良、 腹痛、流鼻血、脫 水、全身疼痛；精 神方面幻覺、妄 想、偏執、焦慮、 短期記憶不足、心 率增加、心跳異 常、抑鬱、出汗增 加、瞳孔散大 |  |
| 19 | 毒郵票 | | 混合性毒品 (二級及三 級) | 多種強烈迷幻 藥成分，主要 成份為LSD | 興奮、感官放大、 產生變形錯覺 | 內含的LSD會對人體 神經中樞產生損害 ，長期使用會誘發 「精神分裂症」等 症狀，甚至產生自 殘、自毀、自盡等 行為 |  |
| 20 | 毒品咖啡包 | | 混合性毒品 (二級及三 級) | 主要成份由二 級毒品MDMA(搖 頭丸)或 MDPV(浴鹽)、 三級毒品K他命 等混合而成 | 飄飄然、興奮、幻 覺 | 幻覺、心律不整、 妄想型精神病、記 憶力衰退、大腦不 可逆的傷害 |  |


K他命與常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|--|----|-------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 21 | Happy粉 | | 混合性毒品 | 主要成份由K他命、副甲氧基甲基安非他命(PMMA)等混合而成 | 興奮、全身發熱、增強性慾 | 休克、猝死 |  蘋果日報 |
| 22 | 彩虹菸 | | 混合性毒品 | 搖頭丸、K他命、一粒眠、FM2、卡西酮類等多種成分 | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用 | 迷幻、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、罹患慢性間質性膀胱炎 |  |
| 23 | 甲氧基甲基安非他命 (Methoxymethamphetamine; MMA) | | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 心悸、臉部潮紅、出汗、心搏過速、血管收縮、血壓升高、體溫上升、瞳孔放大 | 心房性或心室性心律不整、高血壓、腦溢血、肺水腫、心臟衰竭、休克等。失眠、易怒、食慾減退、體重減輕、體溫過高、情緒改變、妄想型思覺失調症、幻覺、幻聽、強迫性的反覆行為、中風等 |  |

K他命與常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製
104年1月制訂、110年4月修訂六版

| 序號 | 名稱 | 俗稱 | 毒品級數 | 分類 | 作用 | 危害 | 常見外觀 |
|----|--|-------------------------|-------|----------------------|---|-------------------------------|---|
| 24 | 對甲氧基甲基安非他命 (Paramethoxymethamphetamine ; PMMA, 為MMA異質物) | 強力搖頭丸 超級搖頭丸 另類搖頭丸 | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 興奮、心搏加速、血壓上升、發汗及脫水 | 抽搐、發抖、胡言亂語、休克、熱衰竭、腦水腫、中風、心律不整 |  |
| 25 | 吩坦尼 Fentanyl | 芬太尼 | 第二級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 類鴉片類強效麻醉性止痛劑，藥效更勝嗎啡。常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛 | 噁心、嘔吐、便秘、暈眩、嗜睡、嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡 |  |