






# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱   | 俗稱                               | 毒品級數  | 分類                      | 作用                              | 危害                                       | 常見外觀  |
|----|--|----------------------------------|-------|-------------------------|---------------------------------|--|---|
| 1  | 二氫去氧嗎啡<br>(Desomorphine)                                       | 鱷魚<br>(Krokodil)                 | 第一級毒品 | 中樞神經抑制劑                 | 擁有快速且強效的類鴉片藥物的鎮靜、止痛效果           | 壞疽、靜脈炎、血栓、肺炎、腦膜炎、敗血症、骨髓炎、肝腎損傷、腦損傷及愛滋病感染等 |    |
| 2  | 苯環利定<br>(Phencyclidine; PCP)                                   | 天使塵<br>(Angel Dust)<br>Love boat | 第二級毒品 | 中樞神經迷幻劑                 | 麻醉用                             | 會引起幻覺、躁動、胡言亂語、喪失方向感、暴力傾向、思覺失調等           |    |
| 3  | 3,4-亞甲基雙<br>氧焦二異丁基<br>(3,4-Methylenedioxypropylvalerone; MDPV) | 浴鹽                               | 第二級毒品 | 新興影響精神<br>物質<br>中樞神經興奮劑 | 強烈興奮感、性慾增強、飢餓感減弱、睡眠減少；僅攝入少量就易成癮 | 恐慌、妄想、焦慮、躁動、失眠、營養不良、脫水、發汗、腹痛、流鼻血和全身疼痛等   |  |



# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱   | 俗稱                                | 毒品級數  | 分類      | 作用             | 危害  | 常見外觀   |
|----|--|-----------------------------------|-------|---------|----------------|---|--|
| 4  | 液態搖頭丸<br>(Gamma-Hydroxybutyrate; GHB)                    | 神仙水<br>G水                         | 第二級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 具鎮靜及麻醉效果       | 昏睡、暈眩、噁心、暫時記憶性喪失、視幻覺、心搏減慢、痙攣、呼吸抑制、昏迷等                           |   |
| 5  | 亞甲基雙氧甲基安非他命<br>(3,4-Methylenedioxymethamphetamine; MDMA) | 搖頭丸<br>狂喜<br>忘我<br>綠蝴蝶<br>Ecstasy | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 欣快感、多話、提升感官敏感度 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、幻覺、自殺意念；過量時產生體溫過高度、脫水、低血鈉、急性高血壓、橫紋肌溶解症及急性腎衰竭等症狀 |  |




# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱                    | 俗稱   | 毒品級數  | 分類      | 作用                   | 危害   | 常見外觀   |
|----|-----------------------|--|-------|---------|----------------------|--|--|
| 6  | 硝甲西洋<br>(Nimetazepam) | 一粒眠<br>五仔<br>紅豆<br>Give Me<br>Five         | 第三級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 治療焦慮、失眠、酒精戒斷、肌肉緊縮等症狀 | 噁心、嘔吐、近期記憶喪失、反彈性失眠、幻覺、憂鬱、呼吸抑制；對使用超過四周之長期使用者造成記憶力、注意力障礙                       |   |
| 7  | 愷他命<br>(Ketamine)     | 卡門<br>K他命<br>K仔<br>Special K<br>Cat Valium | 第三級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用   | 專注力及記憶力受損、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、陣攣性發作；罹患慢性間質性膀胱炎，使膀胱壁纖維化增厚，容量變小，甚至需進行膀胱重建手術 |  |




# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱  | 俗稱              | 毒品級數  | 分類      | 作用                                    | 危害                             | 常見外觀  |
|----|---|-----------------|-------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 8  | 4-甲基甲基卡西酮<br>(Mephedrone)                   | 喵喵<br>Meow Meow | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 類似安非他命和搖頭丸的作用，引發中樞神經、心血管或是腸胃道、泌尿系統異常  | 嚴重幻覺、腦部受損、自殘傾向                 |    |
| 9  | 氯苯基環戊酮<br>(Chlorophenyl cyclopentyl ketone) | 香香              | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 欣快感、時空認知扭曲的心理作用                       | 濫用可能產生心搏過速、高血壓、高熱、幻覺、妄想，嚴重甚至死亡 |   |
| 10 | 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮<br>(Methylone)               | bk-MDMA         | 第三級毒品 | 中樞神經興奮劑 | 作用與MDMA或甲基安非他命類似，無醫療用途；欣快感、多話、提升感官敏感度 | 焦慮、現實脫離感、短期記憶缺損、精神病、幻覺、自殺意念    |  |



# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱  | 俗稱               | 毒品級數  | 分類  | 作用                          | 危害   | 常見外觀  |
|----|---|------------------|-------|---|-----------------------------|--|---|
| 11 | 甲基胺丙基苯<br>并呔喃<br>(2-Methylaminopr<br>opyl)<br>Benzofuran ;<br>MAPB)               | 炸彈<br>Benzo Fury | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑   | 亢奮                          | 高血壓、心跳加快、<br>身體抽搐、痙攣伴隨<br>劇烈心跳、失去意識<br>，嚴重導致死亡                                 |    |
| 12 | 卡痛<br>Kratom  | Biak<br>Ketum    | 第三級毒品 | 植物性成癮物<br>質，少量會產<br>生中樞神經性<br>興奮；用量高會<br>造成鎮靜效果 | 鎮定劑、止痛藥                     | 噁心、發癢、冒汗、<br>口乾舌燥、便秘、頻<br>尿和食欲不振；長期<br>使用會導致體重降<br>低、厭食、失眠、妄<br>想、錯覺和嚴重的混<br>亂 |   |
| 13 | 5-甲氧基-N,N-二<br>異丙基色胺<br>(5-MeO-DIPT, 5-<br>Methoxy-<br>diisopropyltrypt<br>amine) | 火狐狸              | 第四級毒品 | 中樞神經迷幻<br>劑                                     | 興奮感、強烈幻<br>覺、對空間時間<br>的感覺改變 | 瞳孔放大、噁心、嘔<br>吐、視覺及聽覺扭<br>曲、腹瀉，過量使用<br>具致命危險                                    |  |




# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱                                 | 俗稱            | 毒品級數          | 分類      | 作用                            | 危害  | 常見外觀   |
|----|------------------------------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|---|--|
| 14 | 類大麻活性物質                            | K2<br>Spicy   | 第二級毒品、第三級毒品   | 中樞神經迷幻劑 | 興奮感、強烈幻覺，改變對空間時間的感覺，迷幻效果比大麻更強 | 焦慮、噁心、幻覺、妄想、心跳過速、短期失憶、記憶受損、無方向感、狂躁、腦部認知功能改變、逐漸喪失協調性與專注力或昏迷，甚至傷害呼吸系統 |   |
| 15 | 一氧化二氮，學名為氧化亞氮 (Nitrous oxide; N2O) | 笑氣<br>吹汽球     | 未列級數；列入關注化學物質 | 中樞神經抑制劑 | 全身性麻醉作用                       | 頭重腳輕、漂浮感、欣快感、身體麻木感；長時間使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、立體感完全喪失等症狀，亦會產生抑鬱、精神錯亂    |  |
| 16 | 三甲氧苯乙胺 (Mescaline)                 | 麥司卡林<br>仙人掌毒鹼 | 第二級毒品         | 中樞神經迷幻劑 | 服用後會心搏加快、體溫和血壓升高、皮膚發癢和乾燥      | 幻覺、精神混亂、產生暴力行為  |  |

# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱            | 俗稱                 | 毒品級數             | 分類  | 作用             | 危害   | 常見外觀  |
|----|---------------|--------------------|------------------|---|----------------|--|---|
| 17 | 恰特草<br>Khat   | 阿拉伯茶<br>巧茶<br>東非罌粟 | 第二級毒品            | 含有第二級毒品<br>卡西酮<br>(Cathinone)與<br>第四級毒品去<br>甲麻黃鹼<br>(Cathine) | 興奮、對中樞神經具有刺激作用 | 引起擬交感神經興奮、造成瞳孔放大、心搏加快和血壓增加、易患潰瘍，食慾不振、長期使用會導致永久牙齒變黑(呈綠色)              |    |
| 18 | 夫拉卡<br>Flakka | 礫石                 | 未列級數             | 合成仿興奮劑<br>卡西酮<br>(Cathinone)的<br>化學物質，是<br>從阿拉伯茶提<br>煉而成      | 興奮、不能入睡        | 失眠、營養不良、腹痛、流鼻血、脫水、全身疼痛；精神方面幻覺、妄想、偏執、焦慮、短期記憶不足、心率增加、心跳異常、抑鬱、出汗增加、瞳孔散大 |   |
| 19 | 毒郵票           |                    | 混合性毒品<br>(二級及三級) | 多種強烈迷幻<br>藥成分，主要<br>成份為LSD                                    | 興奮、感官放大、產生變形錯覺 | 內含的LSD會對人體神經中樞產生損害，長期使用會誘發「思覺失調症」等症狀，甚至產生自殘、自毀等行為                    |  |

資料參考/圖片來源：法務部反毒大本營、內政部刑事警察局、電子新聞媒體

# 常見新興毒品一覽表




臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱     | 俗稱 | 毒品級數             | 分類                                       | 作用                 | 危害                                   | 常見外觀   |
|----|--------|----|------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--|
| 20 | 毒品咖啡包  |    | 混合性毒品<br>(二級及三級) | 主要成份由二級毒品MDMA(搖頭丸)或MDPV(浴鹽)、三級毒品K他命等混合而成 | 飄飄然、興奮、幻覺          | 幻覺、心律不整、妄想型精神病、記憶力衰退、大腦不可逆的傷害        |   |
| 21 | Happy粉 |    | 混合性毒品            | 主要成份由K他命、副甲氧基甲基安非他命(PMMA)等混合而成           | 興奮、全身發熱、增強性慾       | 休克、猝死                                |   |
| 22 | 彩虹菸    |    | 混合性毒品            | 搖頭丸、K他命、一粒眠、FM2、卡西酮類等多種成分                | 全身性麻醉劑，產生與現實環境解離作用 | 迷幻、心搏過速、血壓上升、震顫、肌肉緊張而呈強直性、罹患慢性間質性膀胱炎 |  |



# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號 | 名稱   | 俗稱                      | 毒品級數  | 分類                   | 作用  | 危害   | 常見外觀  |
|----|--|-------------------------|-------|----------------------|---|--|---|
| 23 | 甲氧基甲基安非他命<br>(Methoxymethamphetamine ; MMA)            |                         | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 心悸、臉部潮紅、出汗、心搏過速、血管收縮、血壓升高、體溫上升、瞳孔放大             | 心房性或心室性心律不整、高血壓、腦溢血、肺水腫、心臟衰竭、休克等。失眠、易怒、食慾減退、體重減輕、體溫過高、情緒改變、妄想型思覺失調症、幻覺、幻聽、強迫性的反覆行為、中風等 |    |
| 24 | 對甲氧基甲基安非他命<br>(Paramethoxyamphetamine ; PMMA, 為MMA異質物) | 強力搖頭丸<br>超級搖頭丸<br>另類搖頭丸 | 第二級毒品 | 中樞神經興奮劑(安非他命及相似濫用物質) | 興奮、心搏加速、血壓上升、發汗及脫水                              | 抽搐、發抖、胡言亂語、休克、熱衰竭、腦水腫、中風、心律不整  |   |
| 25 | 吩坦尼<br>Fentanyl  | 芬太尼                     | 第二級毒品 | 中樞神經抑制劑              | 類鴉片類強效麻醉性止痛劑，藥效更勝嗎啡。常用於手術麻醉、癌症末期病患、重度疼痛、慢性頑固性疼痛 | 噁心、嘔吐、便秘、暈眩、嗜睡、嚴重者會因呼吸抑制而導致死亡  |  |

# 常見新興毒品一覽表

臺南市政府毒品危害防制中心製  
104年1月制訂、112年2月修訂八版

| 序號         | 名稱                           | 俗稱         | 毒品級數  | 分類      | 作用                             | 危害                      | 常見外觀  |
|------------|------------------------------|------------|-------|---------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 26         | 墨西哥鼠尾草<br>(Salvia divinorum) | 飛行草<br>夢境草 | 第三級毒品 | 中樞神經迷幻劑 | 出現類似大麻、LSD、K他命的迷幻作用，產生妄想、幻覺、混亂 | 嚴重導致精神障礙及思覺失調症          |  |
| 27<br>(新增) | 丙泊酚 (Propofol)               | 牛奶針        | 第四級毒品 | 中樞神經抑制劑 | 全身性麻醉劑                         | 失去意識、心跳減緩、呼吸抑制，嚴重者會導致死亡 |  |