繞著臺灣看植物：低海拔森林地生草花 二之二

樹林下的多變野花

馬藍屬與鴨跖草科

文・攝影／鄭元春

看過低海拔森林的月桃類、苦苣苔類等野花後，讓我們再來瞧瞧其他野花。本篇選出其中最常見的四類作為代表，分別是馬藍屬、鴨跖草科、冷水麻屬及樓梯草屬。馬藍屬屬於爵床科，後兩類則是蕁麻科家族的成員。

馬藍屬以藍色花為主

入秋以後，馬藍屬植物就陸續穿上藍色彩衣；它們或高或矮，或直立或匍匐，經常成群聚生為林下增添色彩。

這群偏好陰涼的野花有幾種相當常見，分別是：莖葉多毛，在秋冬季開花的臺灣馬藍；莖葉無毛，花期在秋季，莖葉是絕佳藍色染料的馬藍；經常在樹林下成群成片且匍匐生長的蘭崁馬藍；以及因花萼上有密生腺毛而得名的腺萼馬藍等。

鴨跖草科花朵很多變

鴨跖草科植物在臺灣的種類不多，大多喜歡較潮溼的環境，但是有些偏好充足的陽光，有些則是生長在較陰暗的場所，這邊介紹的是後者。

杜若是樹林下或樹林邊的「常客」，夏天會開純白色花，植株壯碩而優雅。中國穿鞘花花絲上有許多念珠狀細毛，開花時很容易受到風雨影響，因為念珠狀細毛在風吹或雨打後會纏在一起。

毛果竹葉菜果實毛茸茸的，會開純白色的花，朵朵向下懸垂，模樣可愛。毛葉鴨舌疝的葉片邊緣有毛，花是少見的藍紫色，在秋季綻放。吊竹草的葉子有色斑，十分漂亮，它的花在幽林下顯得非常耀眼。巴西水竹葉在潮溼的樹林下很常見，花期主要在春、夏。

▲臺灣馬藍在秋冬季開花。

▶腺萼馬藍花萼有密生腺毛。

▲毛葉鴨舌疝的花是藍紫色。

▲毛果竹葉菜的花向下懸垂。

◀杜若的花為純白色。

冷水麻屬花朵呈綠色

蕁麻科家族的成員相當複雜，有草本也有木本；葉子有對生也有互生。冷水麻屬成員屬於草本的對生葉植物，通常莖葉翠綠，連花朵都是綠色的，儘管數量龐大，隨處可見，仍然顯得十分低調。較常見的代表有：葉片有密集平行小脈的野牡丹葉冷水麻；葉片全緣無缺刻的西南冷水麻；在冬季到春季開花、嫩莖上有細毛的短角冷水麻等。

樓梯草屬沒有總花梗

樓梯草屬成員屬於草本互生葉植物，花朵成簇生長在葉腋，沒有總花梗，與花軸抽長，且有分枝的冷水麻屬成員大異其趣。例如：莖葉多毛、成熟果實會被白色的退化雄蕊彈出去，葉尖細長的冷清草；葉子是同類中最寬闊的闊葉樓梯草；莖上有退化小葉的絨莖樓梯草等。

另外，赤車使者雖然長得很像冷清草，但莖葉沒什麼毛，因為花序有總花梗，而被歸類在赤車使者屬中。

◀吊竹草的花在幽林下非常耀眼。

◀巴西水竹葉花期主要在春夏兩季。

◀野牡丹葉冷水麻的花很不起眼。

▲赤車使者的雄花有五枚雄蕊。

有點惹人厭的咬人貓

有一種莖葉長著「痲毛」的蕁麻科植物叫作咬人貓，喜歡住在低至中海拔的樹林下，混生在其他草本植物中，冷不防就「咬」登山客一口，讓人恨得牙癢癢。

咬人貓咬人，是指碰觸到它含有蟻酸的痲毛，立刻會有痛、癢、麻及灼熱感；半天到兩天後才會消失。要避免被咬，除了得好好認識它外，在山區走路時務必小心，雙手也不要亂揮亂抓！

▲咬人貓開花。

主編　翟　翱　科學版：edit8@mdnkids.com，週一至週六刊出。歡迎適於兒童閱讀的科學知識文章投稿。本刊得對來稿刪修，並同步刊載於電子報。投稿三週內若未通知，請自行處理。