

繞著臺灣看植物：低海拔林下的灌木

文・攝影／鄭元春



果實多彩好亮眼 雞屎樹屬與紫金牛科

看過低海拔森林下的地生蘭和各種草花之後，輪到灌木類上場。根據鄭叔叔的觀察，生長在光線不足樹林下的灌木類，花朵通常偏小，花色偏白；成熟果實不大，但色彩變化多。



▲琉球雞屎樹的白色花很醒目。



▲柯氏雞屎樹的花萼是同類中最長的。



▲毛雞屎樹的果實呈美麗的藍色。

雞屎樹屬果實特別

雞屎樹屬是茜草科家族的成員，因揉搓它的莖葉會散發臭味而得名，全臺灣約有十六種，大多以低海拔的森林為家。

琉球雞屎樹最為常見，花期主要在夏、秋；全株的毛茸不多，白花與藍果讓人眼睛為之一亮。毛雞屎樹的莖葉與苞片長滿長毛，花常稀稀落落的開，果實藍得很美。

圓葉雞屎樹的葉子並不是圓的，而是葉基呈歪形（中肋兩側大小不等）；



▲山桂花的宿存花萼會完全包裹果實。



▲臺灣山桂花的盛花期在四月間。

紫金牛科十分常見

臺灣低海拔的森林裡，紫金牛科的灌木比比皆是。臺灣山桂花最常出現，盛花期在四月間；它的宿存花萼會包裹果實約三分之二面積，果實只露出末端。

山桂花有較前者長的花冠筒，宿存花萼則會完全包裹果實，所以只要看花或果，很容易區分兩者。



▲玉山紫金牛的花有許多白色腺點。



▲玉山紫金牛的成熟果實很搶眼。

其他開白花的灌木

石苓舅生長在中北部低海拔的森林裡，是柑橘類的表親，會開出類似橘子花一般

玉山紫金牛的花有許多白色腺點，成熟果實色彩艷麗，相當吸睛；黑星紫金牛長得較高瘦，果實色彩多變，稱得上是家族異類；華紫金牛是草本狀的小灌木，有黑色的成熟果實。

白花瑞香是瑞香科，通常在最冷的時候開花，成熟果實很迷人，值得栽培觀賞。過山香的花是綠白色的，有四片花瓣；小葉歪歪的，活像一把把小葉刀，煞是有趣；果實同樣又美又好吃，還帶有特別的香氣！



▲石苓舅的成熟果實可以吃了。



▲九節木的花小而不顯眼。



▲黑星紫金牛果實色彩多。




▲圓葉布勒德藤十分美麗。

一起保育圓葉布勒德藤

圓葉布勒德藤大多附生在山溝附近的巨石或岩壁上，但隨著土地開發和水庫興建，處境岌岌可危，該是妥善保育它的時候了，大家一起加油吧！



▲白花瑞香通常在最冷的時候開花。



▲過山香的果實又美又好吃。