



繞著臺灣看植物：低海拔森林的蔓藤 二之二

上樹精靈 裝點森林

豆科以外的蔓藤成員

文・攝影／鄭元春

低海拔森林中的蔓藤，除了豆科植物之外，還有許多其他家族的成員，其中有大家比較熟悉，也有大家比較陌生的爬藤。以下就請它們一一出場，看看小朋友認得幾種。



▲百香果的花又大又美。

►毛西番蓮的花只在早上綻放。



▲寶島玉葉金花呈鮮黃色。



▲雞屎藤花如鈴鐺。



▲變葉懸鉤子果實滋味甜美。



薔薇科家族果實甜美

大家耳熟能詳的水果。它百香果本名西番蓮，是大家耳熟能詳的水果。它的花又大又美，除了花萼與花瓣之外，還有細絲狀的副花冠，整朵花非常特別，十分漂亮；果實經常一個接一個結在同一條莖上，懸垂的樣子很吸睛。

毛西番蓮因莖葉長了許多腺毛而得名，它的花比百香果小一號，雖然只在早上綻放，但吸睛程度不遜於百香果；成熟果實是橘色的，種子的假種皮甜蜜多汁，幸運遇上了，一定要好好吃一口。

三角葉西番蓮因葉片常呈三角狀而得名，它的花沒有花瓣，是同類中的異數；成熟果實是黑色的，

臺北玉葉金花沒有明顯的花瓣狀花萼，花色偏白，與前一種的花迥然不同。雞屎藤的名稱來自它全株的怪異臭味，夏季到秋季間會開大量的花，花形酷似小鈴鐺。

臺灣玉葉金花沒有明顯的花瓣狀花萼，花色偏白，與前一種的花迥然不同。雞屎藤的名稱來自它全株的怪異臭味，夏季到秋季間會開大量的花，花形酷似小鈴鐺。

臺北玉葉金花沒有明顯的花瓣狀花萼，花色偏白，與前一種的花迥然不同。雞屎藤的名稱來自它全株的怪異臭味，夏季到秋季間會開大量的花，花形酷似小鈴鐺。

臺北玉葉金花沒有明顯的花瓣狀花萼，花色偏白，與前一種的花迥然不同。雞屎藤的名稱來自它全株的怪異臭味，夏季到秋季間會開大量的花，花形酷似小鈴鐺。

臺北玉葉金花沒有明顯的花瓣狀花萼，花色偏白，與前一種的花迥然不同。雞屎藤的名稱來自它全株的怪異臭味，夏季到秋季間會開大量的花，花形酷似小鈴鐺。

其他科蔓藤花果特異

薔薇科的臺灣何首烏與毛貢科的串鼻龍都會開大量

初夏開桃紅色的花，它的果實偏綠色；同科的乳藤是酸藤的親兄弟，花呈乳黃色，果實則呈黃褐色，兩者的花果大不相同。

低海拔森林中的蔓藤，還包含好幾個其他家族的成員。夾竹桃科的酸藤在

夾竹桃科蔓藤大不同

的葉子呈橢圓形，每一朵花只能結一到四個小果實，與一朵花結數十個小果

實的同類大異其趣。

實的同類大異其趣。

實則呈深藍色，同樣在植物界相當罕見。葡萄科的漢氏山葡萄葉子常呈三裂形，果實有毒

，不可誤食，小朋友一定要記得呵！

黃白色的花，為森林邊緣帶來繽紛的色彩。鼠李科的光果翼核木會開不到一公分的花，結出帶著長長翅膀的果實，讓種子得以飛到遠方落腳。茄科的

白英幾乎全株布滿白毛，成熟

的果實紅通通的，也很搶眼。

清風藤科的臺灣清風藤，春季會開少見的綠色花，成熟果

實則呈深藍色，同樣在植物界相當罕見。葡萄科的漢氏山葡萄葉子常呈三裂形，果實有毒

▲酸藤的桃紅色花朵。

►串鼻龍的花經常開滿枝梗。



▲漢氏山葡萄果實有毒，不可誤食。



▲臺灣清風藤的成熟果實呈深藍色。



▲光果翼核木果實有長長的翅膀。

蔓藤植物可以爬多高？

蔓藤植物無論以什麼方式向上攀爬，都以爭取陽光和生存空間為目標，所以它們攀爬的高度自然會超過樹梢。但是如果攀爬的對象是二十公尺以上的高大林木，草本蔓藤才有可能攀爬成功。了，只有強壯的木