

結核菌素皮膚測驗

了解是否被結核菌感染

- 在手臂內側的皮膚下注射試劑
- 會有些微的刺痛
- 施打後，仍可做一般的日常活動
- 48-72小時內，由檢測單位評估反應的大小

檢測部位的照護

- 不要用膠布蓋住
- 如果發癢，不要抓，不要擦藥膏，可用濕毛巾冷敷
- 如果弄濕，不要用力擦乾，只要輕拍即可
- 注射部位周圍可能出現腫脹，通常2星期内會消失

禁忌！ 罹患免疫力不全疾病者

發燒

全身性或局部性的皮膚病、皮膚疹

過去做測驗時，測驗部位出現強烈不良反應

皮膚測驗結果

陽性不代表目前有肺結核；結核菌是否處於活動狀態，需由專科醫師評估胸部X光結果，需要時再加驗痰，才能確定

陽性	陰性
體內有結核菌	體內沒有結核菌
體內曾經有結核菌	空窗期
建議進行潛伏結核感染治療，並應提高警覺，每年照一次胸部X光	三個月再做一次
如果服用預防性用藥或肺結核治療藥物，日後檢測仍為陽性	 ≥10MM=陽性

法規〈傳染病防治法〉

主管機關對於曾與傳染病病人接觸或疑似被傳染者，得予以留驗；必要時，並得令遷入指定之處所檢查、施行預防接種、投藥、指定特定區域實施管制或隔離等必要之處置。違反者除逕行強制處分外，並得處新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰

為免逾越上述法規並維護您自身及家人的健康，請配合相關接觸者檢查事宜

七分篩檢自我測



請留意，含計5分以上
需盡快就醫

結核感染 不可怕 及早篩檢 早治療



廣告
疾情通報及諮詢專線 1922

臺南市政府衛生局
衛生福利部疾病管制署 關心您

防核口訣：
咳三週 快驗痰 勸服藥 全都治