

## 風險行為 vs 預防方法



海洛因等藥物濫用



拒絕毒品



成癮



接受替代治療

(以服用美沙冬/丁基原啡因取代鴉片類藥物)



共用針具或稀釋液



使用清潔針具、  
不共用針具及稀釋液



感染愛滋等血液傳染病



每3-6個月定期接受愛滋篩檢  
使用PrEP



## 藥癮戒治資源 與服務管道



### 有用藥問題或需要戒癮治療？



各縣市政府設有毒品危害防制中心(諮詢專線：0800-770-885)，提供心理支持、法律諮詢、戒癮、愛滋篩檢、減害計畫等服務。



您也可以前往衛生福利部指定之藥癮戒治機構，尋求醫療院所身心科或精神科醫師協助。



### 哪裡可以取得清潔針具呢？



各縣市衛生局設有清潔針具執行點及衛教諮詢服務站！



清潔針具使用後，請記得將針具繳回，不可以棄置在一般垃圾桶唷！



### 認識更多藥癮與愛滋相關資訊？

心口司



藥癮衛教宣導資源

疾管署



藥癮愛滋減害Q&A



衛生福利部疾病管制署  
TAIWAN CDC

# 藥癮減害



## 鴉片類

**藥物種類：**海洛因(4號、白粉)等鴉片類藥物。

**施用方式：**常見以注射方式施用。

**危險性：**共用針具(包含針頭、針筒、稀釋液)而大幅提升感染愛滋、B/C型肝炎等血液傳染病之風險。

### 預防方式：

- **不共用**針具、稀釋液、容器。
- 利用各縣市衛生局有提供之**清潔針具、稀釋液**等衛教諮詢服務。
- 有風險行為，每3-6個月進行**愛滋篩檢**。
- 使用暴露愛滋病毒**前**預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。
- 有用藥問題，積極**尋求**指定藥癮戒治機構或相關單位**協助**。

# 藥愛防治



## 非鴉片類

**藥物種類：**甲基安非他命(煙、安、冰等)、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等非鴉片類藥物。

**施用方式：**常見以吸食或注射(slam)方式施用。

**危險性：**發生「**藥愛**」(Chemsex)行為，又稱**以藥助性**，指性行為時合併使用成癮藥物，以增強感官或感受，而出現自制力降低、影響思考與判斷，繼而發生**未有保護措施的性行為**，大幅提升**感染愛滋病毒、梅毒、淋病等性傳染病之風險**。

**預防方式：**

- **避免使用藥物助性。**
- **性行為時全程正確使用保險套與水性潤滑液。**
- **有風險行為，每3-6個月進行愛滋篩檢。**
- **使用暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)，預防感染愛滋。**
- **有用藥問題，積極尋求指定藥癮戒治機構或相關單位協助。**

## 風險行為vs預防方法



安非他命等藥物濫用



拒絕毒品




以藥助性



接受諮詢及戒癮服務



發生無防護措施行為  
(未用保險套)



使用保險套(搭配水性潤滑液)、PrEP



感染愛滋、梅毒等  
性傳染病



每3-6個月定期接受  
愛滋篩檢



## 愛滋防治資源 與服務管道



### 愛滋篩檢服務管道



疾管署與醫療院所合作，提供免費、快速、隱私且保密的**匿名篩檢服務**，只要約20分鐘即可知道檢驗結果!



您也可以購買**愛滋自我篩檢試劑**，自行檢測唷!



### 篩檢結果代表什麼意義呢?



愛滋匿名篩檢及自我篩檢都屬於初步檢驗，檢驗結果若呈「陽性」，不代表確診感染，請務必前往「愛滋指定醫療院所」接受進一步確認檢驗。



愛滋初步檢驗結果若呈「陰性」，代表沒有感染，但仍可能處於空窗期，還是要避免風險行為、定期篩檢唷!



### 什麼是暴露愛滋病毒前預防性投藥(PrEP)?

PrEP是國際研究證實可有效預防愛滋病毒的事前預防性藥物，透過持續穩定服用藥物，預防感染愛滋病毒的保護力可達9成。



注意!!使用PrEP須經醫師評估，且沒有感染愛滋病毒唷!

