

了解登革熱病媒蚊 (花腳蚊)



埃及斑蚊

室內

深色窗簾、衣服、布幔及
陰暗處所



白線斑蚊

戶外

植物及戶外之陰涼處所

早上9-10點、下午4-5點為吸血高峰期!

防蚊秘訣



巡

視家中積水容器

倒

掉家中積水容器

清

除廢棄物容器

刷

除殘留蟲卵



別幫蚊子養小孩



冷氣集水桶



屋簷排水槽



廢棄容器



底盤積水



容器凹陷處



烘碗機底盤

登革熱症狀

一般症狀

頭痛、
後眼窩痛

發燒 $\geq 38^{\circ}\text{C}$

出疹



肌肉痛

關節痛

警示症狀

呼吸困難



嗜睡

肝臟腫大

躁動不安

持續嘔吐

有上述症狀請盡速就醫

登革熱流行時該怎麼辦？

1. 清除居家環境中各種積水容器，不使病媒蚊孳生。
2. 白天外出活動時避免被登革熱病媒蚊叮咬，可穿著淺色長袖長褲，裸露處噴防蚊液。
3. 家中裝設紗門紗窗。
4. 自主做好巡、倒、清、刷。




登革熱緊急噴藥注意事項

1. 食物、餐具、衣物收妥
2. 關閉電源、瓦斯、大樓偵煙器
3. 蓋好魚缸、關閉打氣電源；寵物帶出戶外
4. 噴藥完成後請保持門窗緊閉一小時
5. 一小時後再打開門窗通風30分鐘，再入屋
6. 注意地板濕滑

Q. 登革熱一定要進家中噴藥？

- 1. 目的：**為防止疫情擴散，殺死帶病毒的斑蚊成蟲，避免個案被病媒蚊叮咬後，再去叮咬其他健康民眾。
- 2. 時間：**依疾管署規定，接獲案例通報後36小時內，需進行緊急化學防治噴藥，接獲通知請民眾配合。
- 3. 使用藥劑：**低劑量合成除蟲菊精。



疫起維護身心健康

為強化登革熱期間民眾心理健康支持，提供諮商服務，協助調適心理壓力與負向情緒，維護身心健康，如有需求可進行預約。

**預約
方式**

專線電話：06-3352982

線上預約：

<https://reurl.cc/XEZY1R>

